

Grille de vérification et formulaire des soins après avortement (après l'intervention)

Nom de la patiente: _____

Date: _____

Avant l'intervention

- Souhaiter la bienvenue à la cliente, la mettre à l'aise
- Évaluer la cliente pour vérifier:
 - si les signes vitaux n'indiquent pas de choc
 - si les saignements vaginaux ne sont pas excessifs
 - qu'il n'existe pas de lésions abdominales
- Le cas échéant, prendre les arrangements nécessaires pour qu'un médecin soit disponible pour l'intervention ou orienter vers un niveau supérieur de soins
- Garantir le caractère privé de l'intervention
- Si la cliente est d'accord, faire participer le mari ou l'accompagnant à la séance de conseils
- Demander/observer/examiner
- Décrire l'intervention
- Obtenir le consentement informé pour l'intervention et la prise en charge de la douleur
- Vérifier que la patiente reçoit suffisamment de médicaments contre la douleur:
 - IM: 30 minutes avant l'intervention
 - Par voie buccale: 30 à 60 minutes avant l'intervention
- Vérifier que tout le matériel est prêt à être utilisé
- Si l'état de la patiente est stable et si le temps le permet, donner des conseils sur les méthodes de PF et demander à la cliente quelle est la méthode de PF qu'elle souhaite utiliser. C'est particulièrement important pour le DIU.

Pendant l'intervention

- Vérifier à ce qu'elle se déroule dans un lieu privé.
- Demander à un assistant de suivre les signes vitaux et d'apporter un soutien verbal. Remettre le counseling jusqu'au moment où l'intervention est achevée
- Suivre de près la patiente pour déterminer si elle a mal, lui donner des médicaments contre la douleur si elle en a besoin et cela ne présente de risques pour elle
- Rassurer la patiente tout au long de l'intervention
- Prendre toutes les mesures de prévention des infections
- Inspecter les tissus pour vérifier que l'intervention est complète

Après l'intervention

- Garder la cliente sous observation pendant une à deux heures. Contrôler les signes vitaux et les saignements vaginaux toutes les 30 minutes
- Lui donner des médicaments contre la douleur si elle a des crampes
- Continuer à respecter son intimité
- Si la patiente est d'accord, demander au mari/à un membre de la famille ou à une amie d'être présent lorsque vous donnez les instructions suivantes:
 - Se reposer
 - Attendre deux jours après que les saignements cessent et avant cela ne rien mettre dans son vagin et ne pas avoir de relations sexuelles
 - Prendre et terminer les médicaments prescrits par le médecin
 - Faire attention aux signes d'alarme qui demandent une attention médicale:
 - Vives douleurs abdominales
 - Fièvre
 - Saignements plus abondants que les règles normales
 - Douleurs malodorantes du vagin
 - Saignements qui durent plus de deux semaines

Après l'intervention (suite)

- Dire à la patiente d'éviter une grossesse pendant six mois. Cela permet à son corps de reposer et lui permettra d'avoir une grossesse plus saine la prochaine fois
- Lui donner des conseils en planification familiale et l'aider à choisir une méthode de PF avant de quitter le centre si elle le souhaite. **(Rappelez-vous que les soins après avortement ne sont complets que lorsque les conseils en PF et l'occasion de choisir une méthode de PF lui ont été donnés)**
- Dire à la cliente qu'elle peut rentrer chez elle après une ou deux heures, si elle se sent bien, si elle est stable et peut marcher sans aide.
- Si elle n'a pas choisi de méthode de PF, prendre rendez-vous dans deux semaines pour une méthode de PF
 - Lui remettre des préservatifs que le couple pourra utiliser jusqu'à ce qu'elle se décide pour telle ou telle méthode
- Informer la cliente sur les besoins suivants:
 - Prophylaxie antipaludique
 - Prophylaxie antitétanique
 - Conseils et dépistage du VIH
 - Evaluation des IST
- Noter tous les résultats dans le dossier de la cliente, remplir le registre des soins après avortement

OBSERVATION APRÈS L'INTERVENTION

Observer pendant 1 ou 2 heures. Evaluer la patiente toutes les 15 à 30 minutes.

Echantillon

Date	11/7/07						
Heure	6:00 p.m.						
Vital Signs							
TA	110/70						
Pouls	76						
Respirations	20						
Température	32C						
Uterus (tick one)							
Ferme	<input type="checkbox"/>						
Mou							
Vaginal Bleedng (tick one)							
Petit							
Moyen	<input type="checkbox"/>						
Large							

Commentaires: _____

Counseling en FP achevé? OUI _____ NON _____ Méthode de PF choisie: _____

Transfert vers un niveau supérieur OUI _____ NON _____ Transféré vers un niveau supérieur? _____

Nom: _____ Date: _____

Signature: _____